

Impfkalender 2024 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Januar 2024

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (2–23 Monate)										Kinder und Jugendliche (2–17 Jahre)					Erwachsene (ab 18 Jahre)																					
	6 Wochen	U4 2	U4 3	4	U6 5-10	U6 11*	U6 12	13-14	15	U7 16-23	U7a/U8 2-4	U9 5-6	U10 7-8	U11/J1 9-14	15-16	J2 17	ab 18	ab 60																			
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)																																	
Tetanus		6-fach-Impfung	N	G2	N	G3 ^c	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	A alle 10 Jahre																		
Diphtherie																				A1	N	A2	N	A alle 10 Jahre													
Keuchhusten (Pertussis)																				A1	N	A2	N	A3 ^g	N												
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)																																					
Kinderlähmung (Poliomyelitis)																															A	N					
Hepatitis B																																					
Pneumokokken ^d		G1 ^b	N	G2	N	G3 ^c	N												S																		
Meningokokken B ^e		G1	N	G2	N	G3	N																														
Meningokokken C							G1	N																													
Masern						3-fach-Impfung MMR	G1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	S ^h																		
Mumps																				3-fach-Impfung MMR + Windpocken	G2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N					
Röteln																																					
Windpocken (Varizellen)						G1	N																														
HPV (Humane Papillomviren)														G1 ⁱ +G2 ⁱ	N																						
Gürtelrose (Herpes Zoster)																			G1 ⁱ +G2 ⁱ																		
Grippe (Influenza)					Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und Schwangere													S jährlich ^k																			
COVID-19					Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen und Schwangere												G1 ⁱ +G2 ⁱ +G3 ⁱ	A jährlich ^k																			

- J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- A** Auffrischimpfung
- G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1-G4)
- S** Standardimpfung

- a die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
- b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
- c Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung: 6 Monate
- d Säuglinge werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft. Erwachsene werden mit PCV20 geimpft.
- e 3 Impfungen für Kinder zwischen 2 und 23 Monaten; bei Impfbeginn ab 24 Monaten 2 Impfungen.

- f 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Abstand von < 5 Monaten zwischen den beiden Impfungen ist eine dritte Impfung erforderlich.
- g einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
- h einmalige Impfung für alle nach 1970 geborene Erwachsene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit

- i zweifache Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten
- j Für die Basisimmunität sind ≥ 3 Antigenkontakte erforderlich, davon mindestens 1 durch Impfung. Impfabstände entsprechend Fachinformationen beachten (zwischen G1 und G2 sowie G2 und G3)
- k jährliche Auffrischimpfung vorzugsweise im Herbst

